


Državni stručni skup: Vrednovanje
ostvarenosti ishoda u nastavi latinskog
jezika u strukovnim školama
23.veljače 2021.

Latinski nazivi biljaka i životinja / Kako
motivirati učenike
Miroslav Kern, prof.
Medicinska škola, Osijek



Equus vehendi causa, arandi bos, venandi et
custodiendi canis, homo autem ortus ad mundum
contemplandum. M. T. Cicero





Arbor

CHALLENGE OF THE DAY



NAME
THESE
BRANDS

NAME
THESE
PLANTS



Hypericum perforatum L.



Salvia officinalis


XXII, 4.

40. Urticaceae.



178. *Urtica dioica* L.

Große Brennnessel.



Thymus serpyllum

Winters & Co.



Melissa officinalis L.

Gedrängte Melisse.



Aesculus hippocastanum



*Petroselinum
crispum* L.



*Achillea
millefolium*

A close-up photograph of a Quercus ilex branch. The leaves are small, elliptical, and have a silvery-grey underside. Two acorns are visible, one in the foreground and one slightly behind it, both showing their characteristic cap and nut. The background is a soft-focus green.

Quercus ilex





















*Larus
cachinnans,
Pallas 1811.*





Larus ridibundus

Phalacrocorax carbo





Turdus merula
Linnaeus, 1758.

Turdus merula,
Linnaeus, 1758.



Corvus frugilegus
Carl Linné, 1758.





Corvus frugilegus
Carl Linné, 1758.



Corvus corax



Corvus cornix

C. cornix





Ardea cinerea

Ciconia ciconia





Tyto alba

Linne'





- Iako su njegovi roditelji htjeli da postane svećenik, Carl završava studij medicine u Uppsali 1732. god. sa nepunih 25 godina kreće na ekspediciju kroz Laponiju – skuplja uzorke i piše bilješke o svemu na što naiđe U knjizi “Flora Lapponica” objavljuje sve botaničke podatke sa svog putovanja





Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incisis, racemis simplicibus.

Solanum lycopersicum L.

Habitat in Peru: innotuit 1590. C. Bauhino. ☉. 24

11. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinna- Lycoperfi-
tis incis. racemis simplicibus. *Vir. cliff. 15. Hort. culn.*
cliff. 60. Roy. lugdb. 423.

Solanum pomiferum, fructu rotundo striato molli.
Bauh. pin. 167.

Pomum amoris. *Cam. epit. 821. Rumph. amb. 5. p.*
416. t. 154. f. 1.

- β. Solanum racemosum cerasorum forma. *Bauh. pin.*
167. prodr. 90.

Habitat in America calidiore. ☉. β. 24

12. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinna- pimpinelli-



Rušćić, Mirko
Centaurea ragusina L.

ragusina.

17. CENTAUREA calycibus ciliatis, foliis tomentosis
pinnatifidis: foliolis obtusis ovatis integerrimis: ex-
terioribus majoribus. *Hort. cliff.* 422. *Roy. lugdb.*
139.

Jacea cretica lutea, foliis cinaræ. *Moris. hist.* 3. p. 141.
f. 7. t. 27. f. 22.

Jacea arborea argentea ragusina. *Zan. hist.* 107. t. 43.
Mill. dict. t. 152. f. 1.

Stœbe montana nivea, capite cardui, subrotundis fo-
liorum lobis. *Barr. ic.* 309.

Habitat in Creta, Epidauro. 4

Folia alba quasi papposa, pinnata lobis rotundatis.

Flos solitarius, pedunculatus, luteus. Radio parvo sty-
lis longis. Calyx magnus: squamis acutis, ciliatis,
flavescentibus.

Cineraria

18. CENTAUREA calycibus ciliatis terminali- sessili-

210
58
2570
CAROLI LINNÆI

EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI,

ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL. ACAD.
PARIS. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPERIAL.
BERNENS. LONDIN. ANGLIC. EDENBURG. MONSPEL.
TOLOS. FLORENT. SOC.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES
PLANTAS RITE COGNITAS

AD
GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS, NOMINIBUS
TRIVIALIBUS, SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS

TOMUS I.

Editio Tertia.

VINDOBONAE.

Typis JOANNIS THOMÆ DE TRATTNER,

CÆS. REG. AULÆ. TYPOGRAPHI ET BIBLIOP.

M DCC LXIV.





Apis mellifera

Lavandula angustifolia

Apis pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, pedibus posticis glabris utrinque margine ciliatis

mellifera. 17. A. pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, pedibus posticis glabris utrinque margine ciliatis.

Fn. suec. 1003.

Mouff. inf. 2.

Swamm. bibl. t. 17. f. 1. operaria.

Aldr. inf. 20.

f. 3. femina.

Jansl. inf. 1. t. 2.

f. 4. mas.

Raj. inf. 240.

Reaum. inf. 5. t. 21. 23. t. 22. f. 1. operaria.

f. 2. mas.

f. 4. femina.

Habitat in Europæ arboribus cavis, frequentius culta.

REGINA (Femina) unica, altior, oblongior, aculeata.

FUCI (Mares) ad 1600, inermes, antennis 11-articulatis. OPERARIÆ (Spadones) ad 20000, antennis

15-articulatis, ventriculis 2 mellis ceræque, aculeatæ

Ense retrorsum serrato venenato latente intra vaginam cuspidatam.

RESPUBLICA Alvearii gynæcocratica est, dum Femina imperans semper inclusa, operariorum custodum satellitio assidue stipata, antennis obvium Marem quemcunque salutat, insiliendoque comprimit cum illius vitæ dispendio; ponit dein ova ad 40000 sæpe quotannis in adaptatis favi cellis: primum neutra, dein mascula, demum nonnulla feminina; his exclusis gradu 2:do supra calorem æstatis ordinariæ, adulescunt Larvæ sextiduo, neut ad parietes cellæ, operiuntur usque dum adultæ evolant, alteroque die mellificant. Mares, ignavum pecus, incurii apricantur serenis diebus, gulle dediti. Spadones operarii, neutri, indefessi, mel e nectare, ceram e polline florum sedulo legunt $\frac{1}{2}$ miliaris spatii, quoties per cælum licet, reducunt, favos
cereos

650
Linnaei
QK91
.C58
1758
v.1
CAROLI LINNÆI

EQUITIS DE STELLA POLARI,
ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL.;
ACAD. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER.
LOND. MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOC.

SYSTEMA NATURÆ

PER
REGNA TRIA NATURÆ,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,
GENERA, SPECIES,

CUM


CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS,
SYNONYMIS, LOCIS.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.

TOMUS I. *Sach. Ekstrand.*

negat
EDITIO DECIMA, REFORMATA. *M. Wallberg.*

Cum Privilegio S:æ R:æ M:tis Sveciæ.



HOLMIÆ,
IMPENSIS DIRECT. LAURENTII SALVII,

1758.

Nomen specificum quo brevius, eo etiam melius. Pulchritudo artis brevitatem exposcit, nam quo simplicius, eo etiam melius; stultum est facere per plura, **quod** fieri potest per pauciora. Natura **ipsa** compediosissima est in omni sua actione.

Nomina generica et specifica litteris diversae magnitudinis scribuntur. Nomen genericum pingatur litteris maioribus Romanis.

(C. Linnaeus)

Classificatio animalium per **hunc** ordinem fit: **species, genus, familia, ordo, classis, phylum, regnum.**

Taksonomske kategorije (taxa):

- 1. Carstvo - Regnum
- 2. Koljeno - Phylum
- 3. Razred - Classis
- 4. Red - Ordo
- 5. Porodica - Familia
- 6. Rod - Genus
- 7. Vrsta - Species



Carstvo – Regnum Amimalia (žvotinje)

Koljeno – Phylum Chordata (svitkovci)

Razred – Classis Aves (ptice)

Red – Ordo Passeriformes (pjevice)

Porodica – Familia Corvidae

Rod – Genus Corvus

Vrsta – Species Corvus corax

Binominalno ime (naziv): *Corvus corax*

Linnaeus, 1758









Hugin
(Pamćenje) i
Munin
(Misao) ,
šalje u svijet
kako bi mu
donijeli vijesti
o
čovječanstvu.

Santo
Expedito



