

**MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE
MLADIH HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA**

13. travnja 2024.

Kategorija: mladi

Zaporka natjecateljske ekipe: _____

Redni broj člana ekipe: _____

RADNA POZICIJA 2

Pisana provjera znanja iz pružanja prve pomoći

Ukupan broj bodova: 16

Broj postignutih bodova: _____

Potpis sudca: _____

Članovi Povjerenstva za utvrđivanje i zbrajanje rezultata:

1. _____
2. _____
3. _____

UPUTE:

1. Za rješavanje pisanih zadataka imaš 10 minuta.
2. Pažljivo čitaj uputu, zadatak i ponuđene odgovore. Samo je jedan odgovor točan.
3. Piši plavom kemijskom olovkom.
4. Jednom napisane odgovore nije dopušteno prepravljati.
5. Za vrijeme rješavanja zadataka članovi ekipe ne smiju međusobno komunicirati.

Zaokruži točan odgovor!

1. Što **NIJE** potrebno navesti pri pozivanju hitne medicinske pomoći?

2	
---	--

- a) točno mjesto nesreće
- b) vrstu ozljeda i broj ozlijeđenih
- c) ime i prezime pozivatelja
- d) ime i prezime osoba koje su svjedočile nesreći

2. Kad provodimo drugi (cjeloviti) pregled?

2	
---	--

- a) odmah nakon prvoga pregleda
- b) samo kad sumnjamo da postoji dodatna ozljeda
- c) samo kad je osoba bez svijesti i ne može nam reći gdje ju boli
- d) nakon zbrinjavanja svih stanja opasnih po život

3. Kod djeteta u besvjesnome stanju reakcija na podražaj se radi:

2	
---	--

- a) glasnim dozivanjem i pozivanjem da otvori oči, stavljanjem jedne ruke na rame uz lagano tapšanje
- b) glasnim dozivanjem i protresanjem oba ramena
- c) glasnim dozivanjem i povlačenjem ušne resice jednoga uha
- d) glasnim dozivanjem i lupkanjem obraza

4. Koja tvrdnja povezana uz stanje šoka je točna?

2	
---	--

- a) najčešće nastaje kad osoba doživi emotivno stresan ili neugodan događaj
- b) ako započne, dolazi do oštećenja organa zbog manjka kisika u tkivima
- c) nastaje isključivo zbog velikoga gubitka krvi
- d) ako započne, stanje šoka može se liječiti postupcima prve pomoći

5. Kod osobe koja se žali na bolno i otežano disanje te pokazuje na ranu na prsnome košu iz koje krv izbija u mjehurićima i prisutan je osjećaj pucketanja kože oko rane posumnjat ćemo na?

2	
---	--

- a) prijelom rebra
- b) probojnu ranu prsnoga koša
- c) unutarnje krvarenje u prsnom košu
- d) srčani udar (infarkt)

6. Kad treba skinuti cjelovitu zaštitnu kacigu?

2	
---	--

- a) ako je kaciga pukla
- b) ako je ozlijeđena osoba bez svijesti i povraća
- c) cjelovita zaštitna kaciga nikad se ne skida
- d) cjelovita zaštitna kaciga uvijek se skida

7. Koji je točan postupak prve pomoći kod osobe kod koje sumnjamo na otrovanje ili predoziranje lijekovima?

2	
---	--

- a) pokušati izazvati povraćanje
- b) dati osobi hladno mlijeko
- c) pokušati pronaći originalnu ambalažu lijekova
- d) dati osobi vodu i medicinski ugljen

8. Koji je od navedenih znakova i simptoma potrebno provjeriti kod osobe kojoj je iznenada pozlilo i žali se na slabost u jednoj strani tijela?

2	
---	--

- a) zamoliti osobu da ponovi rečenicu za osobom koja pruža prvu pomoć na glas ili se nasmiješi
- b) provjeriti odgovor zjenica na svjetlosni podražaj
- c) pregledati usnu šupljinu i izvaditi sadržaj svojim rukama
- d) zamoliti osobu da ustane i napravi nekoliko koraka prema naprijed